

Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung	Alter in Wochen				Alter in Monaten							Alter in Jahren				
	6	2	3	4	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-11	12-17	ab 18	ab 60			
Tetanus		G1	G2	G3	G3	G4	N	N	A1	A2		A (ggf. N) ^f				
Diphtherie		G1	G2	G3	G3	G4	N	N	A1	A2		A (ggf. N) ^f				
Pertussis		G1	G2	G3	G3	G4	N	N	A1	A2		A (ggf. N) ^f				
Hib <i>H. influenzae</i> Typ b		G1	G2 ^a	G3	G3	G4	N	N								
Poliomyelitis		G1	G2 ^a	G3	G3	G4	N	N	N	A1		ggf. N				
Hepatitis B		G1	G2 ^a	G3	G3	G4	N	N	N							
Pneumokokken		G1	G2	G3	G3	G4	N						S ^c			
Rotaviren	G1 ^b	G2	(G3)													
Meningokokken C						G1 (ab 12 Monaten)	N		N							
Masern						G1	N		N			S ^d				
Mumps, Röteln						G1	N		N							
Varizellen						G1	N		N							
Influenza													S (jährlich)			
HPV Humanes Papillomvirus											S ^e					

Erläuterungen

- G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)
- A Auffrischung
- S Standardimpfung
- N Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- a Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
- b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.
- c Einmalige Impfung mit Polysaccharid-Impfstoff, Auffrischung nur für bestimmte Indikationen empfohlen, vgl. Tabelle 2
- d Einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff
- e Standardimpfung für Mädchen und junge Frauen
- f Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.